



Sortie du 2 juillet 2011 (avec l'ANVL et la SMF)

**Mycologie à la mare aux Evées
(forêt de Fontainebleau)**

Animateurs: D. Courtieu, M.P. Vigneron, J.P. Méral, D. Pérès

Résumé: Sortie intéressante puisque, malgré l'absence chronique de pluie, 31 espèces ont été identifiées soit sur place, soit à domicile. Les russules étaient variées – et variables ! ; l'abondance de la golmotte a fait quelques heureux.

Itinéraire: Point de rendez-vous : carrefour de l'Épine Foreuse. Le matin, prospection du sous-bois jusqu'à la mare et autour de celle-ci, y compris les fossés de drainage qui étaient à sec. Pique-nique près des voitures. L'après-midi, parcours par les routes d'Orgenoy, des Billebauts et de l'Épine Foreuse.



Le calme de la mare aux Evées

Participants: 13 personnes dont 3 pour le CNCE.

Météo: depuis plusieurs jours, temps couvert avec petites éclaircies, températures moyennes (25°C).

Mycologie

Plusieurs trouvailles ont donné lieu à longues discussions entre spécialistes. La liste et les commentaires suivants sont établis d'après le document établi par M.P. Vigneron après compléments de détermination à domicile et à la séance hebdomadaire de la SMF :

Collybie radicante var marginata	<i>Oudemansiella radicata var marginata</i>
Amanite rougissante (Golmotte)	<i>Amanita rubescens.</i>
Amanite élevée var spissa	<i>Amanita excelsa var spissa</i>
Amanite safran var. subnudipes	<i>Amanita crocea var. subnudipes</i>
Plutée couleur de cerf	<i>Pluteus cervinus</i>
Psathyrelle de De Candolle	<i>Psathyrella candolleana</i>
Lacrimaire veloutée	<i>Psathyrella lacrymabunda</i>
Psathyrelle sylvestre	<i>Psathyrella populina</i>
Russule noirissante	<i>Russula nigricans</i>
Russule fétide	<i>Russula foetens</i>
Russule pourpre et noire	<i>Russula atropurpurea</i>
Russule charbonnière	<i>Russula cyanoxantha</i>
Russule verdoyante	<i>Russula virescens</i>
Russule vieux-rose	<i>Russula vesca .</i>

Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes et Environs

Russule à pied violet	<i>Russula violeipes</i>
Russule à odeur de miel	<i>Russula melliolens</i>
Russule brun violacé	<i>Russula brunneoviolacea</i>
Lactaire zoné	<i>Lactarius zonarius</i>
Paxille enroulé	<i>Paxillus involutus</i>
Bolet châtain	<i>Gyroporus castaneus</i>
Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>
Bolet tomenteux	<i>Xerocomus subtomentosus</i>
Bolet à chair jaune	<i>Xerocomus chrysenteron</i>
Bolet commun	<i>Xerocomus communis</i>
Cèpe d'été	<i>Boletus aestivalis</i>
Bolet blafard	<i>Boletus luridus.</i>
Bolet à pied rouge	<i>Boletus erythropus.</i>
Bolet de fiel –Chicotin	<i>Tylopilus felleus</i>
Bolet orangé des chênes	<i>Leccinum quercinum</i>
Bolet des peupliers	<i>Leccinum duriusculum f. robustus</i>
Scléroderme aréolé	<i>Scleroderma areolatum</i>

Commentaires :

Xerocomus communis présente de minuscules points rouges dans la chair à la base du pied, en le coupant.

Le dessin dans le Courtecuisse de *Psathyrella populina* n'est pas correct ; la correction sera faite dans la prochaine édition

Amanita crocea var. *subnudipes* a le pied lisse et blanchâtre.



La variabilité déroutante de *Russula violeipes*



Amanita crocea var. *subnudipes*

Aspect ornithologique

La mare aux Evées était peuplée de quelques oiseaux aquatiques : canard colvert (*Anas platyrhynchos*), gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*), foulque macroule (*Fulica atra*) accompagnée de juvéniles.

Rédaction et photos : Alain de Guerra